OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Henrieta Jidbratt, (henko2), Överläkare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-08-19
Giltig till: 2028-08-19

Klonidin (Catapresan) - intensivvård

Innehållsansvariga:
Andreas Thorén överläkare, An-Op-IVA SkaS
Henrieta Jidbratt, överläkare, An-Op-IVA SkaS

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Hypertoni.
Mot oro och agitation vid alkohol och/eller opiatabstinens.
Möjligen även effekt vid abstinens även med sedativa/bensodiazepiner.
Lång halveringstid. Påtagligt längre vid njursvikt!

Arbetsbeskrivning

Alfa-2-agonist, icke – selektiv.

Blandning: 2 ml Catapresan 150 mikrogr/ml + 18 ml NaCl 9 mg/ml = 15 mikrog/ml.
Dos: Sätts i sprutpump. Dosen titreras. Vanlig dos 300–900 mikrog/24 timmar.
Bör sättas ut successivt om man haft hög dos under en längre tid.
Monitorering: Invasiv tryckmätning pga av dess blodtryckssänkande effekt kan också ge tendens till bradykardi.
Kräver licens.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Henrieta Jidbratt, (henko2), Överläkare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9696-242963441-63

Version: 11.0

Giltig från: 2026-08-19

Giltig till: 2028-08-19