

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2025-09-17

Innehållsansvar: Henrieta Jidbratt, (henko2), Överläkare

Giltig till: 2026-09-09

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Klonidin (Catapresan) - intensivvård

Innehållsansvariga:

Andreas Thorén överläkare, An-Op-IVA SkaS

Henrieta Jidbratt, överläkare, An-Op-IVA SkaS

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Hypertoni.

Mot oro och agitation vid alkohol och/eller opiatabstinens.

Möjligen även effekt vid abstinens även med sedativa/bensodiazepiner.

Lång halveringstid. Påtagligt längre vid njursvikt!

Arbetsbeskrivning

Alfa-2-agonist, icke – selektiv.

Blandning: 2 ml Catapresan 150 mikrog/ml + 18 ml NaCl 9 mg/ml = 15 mikrog/ml.

Dos: Sätts i sprutpump. Dosen titreras. Vanlig dos 300–900 mikrog/24 timmar.

Bör sättas ut successivt om man haft hög dos under en längre tid.

Monitorering: Invasiv tryckmätning pga av dess blodtryckssänkande effekt kan också ge tendens till bradykardi.

Kräver licens.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Henrieta Jidbratt, (henko2), Överläkare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9696-242963441-63

Version: 10.0

Giltig från: 2025-09-17

Giltig till: 2026-09-09