

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-18

Innehållsansvar: Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-18

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Girdlestone, extraktion av LIH- eller PFNA-spikar – SVP operation

## Innehållsansvariga:

Sara Söderqvist, sektionsledare, Anestesi SkaS Skövde

Danel Apel, sektionsledare, Operation SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighet i väntan på revidering.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med Girdlestone, extraktion av LIH/PFNA-spikar.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. hög regional anestesi

#### Omvårdnads mål

Fri luftväg

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP operation](#)[Generell anestesi med larynxmask-SVP operation](#)

### Elimination

Risk för skada av urinblåsa r.t. överfylld blåsa

#### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

KAD

### Hud/Vävnad

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

### Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

### Omvårdnadsåtgärder

#### -miljö

Plantopp alternativt ibland vid PFNA används kollumbord. Hör med operatör.

#### [Sidomarkering av pariga organ preoperativt](#)

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Sidoläge på vanlig mjuk madrass som flyttats ner på bordet så det blir ren grop för axeln och sidostöd "Maxfix"

Bakre stödet mot sacrum och främre stödet centralt mot spina iliaca

Geldyna mellan benen

Armbordet vinklat mot huvudändan som sätts vid bukstödet

Stor kudde mellan armarna

Efter operation läggs röda mattan bakom patienten, vänd över till rygg och flytta till säng

### Sömn

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness

r.t.

ytlig generell anestesi

#### Omvårdnads mål

God sömn

#### Omvårdnadsåtgärder -läkemedelshantering

Vid generell anestesi

Anestesiform: Larynxmask + TCI/TIVA

### Smärta

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta

r.t.

ingreppet

#### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

#### Omvårdnadsåtgärder -läkemedelshantering

Spinalanestesi

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-111

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2024-10-18

**Giltig till:** 2026-10-18