

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2024-10-18

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-18

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) vuxna och barn – SVP operation

Innehållsansvariga

Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde
Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Ny länk under Andning/Cirkulation.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med PEG, endoskopisk gastrostomi.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. sedering/generell anestesi
Risk för hypovolemi r.t. blödning

Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Anestesiform enligt [Propofolsedering - anestesi](#)

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

[Provtagning - preoperativ](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan enligt [Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Höger arm på armbord och vänster arm i armskena. Kontrollera vänster hand.

Benremmar

-speciell omvårdnad

Endoskopistapel vid vänster huvudända

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig sedering/generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesiform enligt [Propofolsedering-anestesi](#)

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

TIVA enligt: [Propofol – Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet
Risk för smärta r.t. nålsättning

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

EMLA och ordinerad premedicinering. [Preoperativ medicinering - barn](#)

Eventuellt Opiat och/eller NSAID

Eventuell lokalbedövning läggs av operatör

Mixtur Bactrim 40 mg/ml oral lösning. 20 ml läggs i den nysatta PEG:en. Mixturen finns i operations apotek. Öppnad flaska är hållbar i 30 dagar, förvaras i kylskåpet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-148

Version: 15.0

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18