

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2024-10-23

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-23

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Stomiuppläggning - SVP operation

Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde
Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Tillägg under Andning/Cirkulation Omvårdnadsåtgärder.

Ny länk under Smärta Omvårdnadsåtgärder

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med uppläggning av stomi.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t.

generell anestesi

Risk för hypovolemi

r.t.

blödning

Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) – TCI](#)

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

[Provtagning preoperativ](#)

[ERAS vid kolorektal kirurgi – anestesi](#) gällande smärtlindring, antiemetika, vätska peroperativt [ERAS vid kolon- och tunntarmskirurgi](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa

r.t.

överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Cystofix

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Båda armarna på armbord

Benremmar

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi
--------------------	------	-------------------------

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesiform enligt: [Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta	r.t.	ingreppet
------------------------------	------	-----------

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Opiat och/eller NSAID

Enligt: [ERAS vid kolorektal kirurgi - anestesi](#)

[ERAS vid kolon- och tunntarmskirurgi](#)

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-176

Version: 14.0

Giltig från: 2024-10-23

Giltig till: 2026-10-23