OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-07-21
Giltig till: 2028-07-21

Varicer i bukläge - SVP operation

Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde
Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå variceroperation i bukläge.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation
Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi, hög regional anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotension	r.t.	hög regional anestesi

Omvårdnadsmål
Fri luftväg
MAP mer än 65
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
Regional anestesi – spinal eller epidural – SVP operation alternativt
Generell anestesi med intubation- SVP
Propofol-Remifentanil (Ultiva) - TCI
Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi
Provtagning - preoperativ
Tuben fixeras med specialtejp Tensoplast Sport

Elimination
Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa

Omvårdnadsmål
Ingen blåsskada
Omvårdnadsåtgärder
Bladderscan enligt Blåstappning vid anestesi
KAD om spinal

Hud/Vävnad
Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Omvårdnadsmål
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder
-miljö
Valfri topp
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Vid anestesi inled detta i sängen och vänd över till bukläge på det stationära operationsbordet.
Kudde under bröstet
Tejpa ögonen med cornea care
Ansiktet i ansiktsmask för bukläge, var aktsam på nacken, så neutralt som möjligt, översträck ej axlar/armar.
Båda armarna på armbord med kuddar/dynor under armarna
Benrem över benet som inte ska opereras
Kudde under skenbenet, tårna hängande fritt
-speciell omvårdnad
Sövd patient kontrollera ögon, öron och nacke
Kontrollera penis/scrotum

Sömn
Omvårdnadsdiagnos
Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi
Omvårdnadsmål
God sömn

Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
Vid anestesi enligt anestesiform Generell anestesi med intubation – SVP operation
TIVA enligt Propofol-Remifentanil (Ultiva) - TCI

Smärta
Omvårdnadsdiagnos
Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet
Omvårdnadsmål
VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
Vid spinal enligt anestesiform Regional anestesi – spinal eller epidural – SVP operation
Vid anestesi eventuell Opiat och/eller NSAID. Eventuell lokalanestesi läggs av operatör

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
Kunskapsunderlag

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-187

Version: 13.0

Giltig från: 2026-07-21

Giltig till: 2028-07-21