

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård  
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare  
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18

# Varicer i bukkläge - SVP operation

## Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde  
Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå variceroperation i bukkläge.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi, hög regional anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotension	r.t.	hög regional anestesi

#### Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Regional anestesi – spinal eller epidural – SVP operation](#) alternativt

[Generell anestesi med intubation- SVP](#)

[Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

[Provtagning - preoperativ](#)

Tube fixeras med specialtejp Tensoplast Sport

### Elimination

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa
---------------------------	------	-----------------

#### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan enligt [Blåstappning vid anestesi](#)

KAD om spinal

### Hud/Vävnad

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge

### Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

### Omvårdnadsåtgärder

#### -miljö

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Vid anestesi inled detta i sängen och vänd över till bukläge på det stationära operationsbordet.

Kudde under bröstet

Tejpa ögonen med cornea care

Ansiktet i ansiktsmask för bukläge, var aktsam på nacken, så neutralt som möjligt, översträck ej axlar/armar.

Båda armarna på armbord med kuddar/dynor under armarna

Benrem över benet som inte ska opereras

Kudde under skenbenet, tårna hängande fritt

#### -speciell omvårdnad

Sövd patient kontrollera ögon, öron och nacke

Kontrollera penis/scrotum

### Sömn

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. yttlig generell anestesi

#### Omvårdnads mål

God sömn

### Omvårdnadsåtgärder

#### -läkemedelshantering

Vid anestesi enligt anestesiform [Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

### Smärta

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

#### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

### Omvårdnadsåtgärder

#### -läkemedelshantering

Vid spinal enligt anestesiform [Regional anestesi – spinal eller epidural – SVP operation](#)

Vid anestesi eventuell Opiat och/eller NSAID. Eventuell lokalanestesi läggs av operatör

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (anssu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-187

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2024-10-18

**Giltig till:** 2026-10-18