

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-24

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-24

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Variceroperation – SVP operation

Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde
Thomas Karlberg, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.
Uppdatering av länkar

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå variceroperation.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi, hög regional anestesi

Risk för hypovolemi r.t. blödning

Risk för hypotension r.t. hög regional anestesi

Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi med larynxmask-SVP operation](#) alternativt

[Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP operation](#)

[Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

[Provtagning preoperativ](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan enligt [Blåstappning vid anestesi](#)

KAD om spinal

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Valfri topp
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Båda armarna på armbord
Benrem över benet som inte ska opereras

-speciell omvårdnad

Eventuellt blodtomt fält anläggs sterilt

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesiform enligt: [Generell anestesi med larynxmask – SVP operation](#)

TIVA enligt: [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Vid anestesi eventuell Opiat och/eller NSAID. Eventuell lokalanestesi läggs av operatör.

Vid spinal enligt Anestesiform: [Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP operation](#)

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-189

Version: 12.0

Giltig från: 2024-10-24

Giltig till: 2026-10-24