OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VE An Op IVA
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-07-27
Giltig till: 2028-07-27

Variceroperation – SVP operation

Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde
Thomas Karlberg, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.
Uppdatering av länkar

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå variceroperation.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation
Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi, hög regional anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotension	r.t.	hög regional anestesi

Omvårdnadsmål
Fri luftväg
MAP mer än 65
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
Generell anestesi med larynxmask-SVP operation alternativt
Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP operation
Propofol - Remifentanil (Ultiva) - TCI
Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgin
Provtagning preoperativ

Elimination
Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa

Omvårdnadsmål
Ingen blåsskada
Omvårdnadsåtgärder
Bladderscan enligt Blåstappning vid anestesi
KAD om spinal

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Hud/Vävnad
Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge

Omvårdnadsmål
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada
Omvårdnadsåtgärder
-miljö
Valfri topp
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Båda armarna på armbord
Benrem över benet som inte ska opereras
-speciell omvårdnad
Eventuellt blodtomt fält anläggs sterilt

Sömn
Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi

Omvårdnadsmål
God sömn
Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
Anestesiform enligt: Generell anestesi med larynxmask – SVP operation
TIVA enligt: Propofol - Remifentanil (Ultiva) - TCI

Smärta
Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta	r.t.	ingreppet

Omvårdnadsmål
VAS mindre än 4
Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
Vid anestesi eventuell Opiat och/eller NSAID. Eventuell lokalanestesi läggs av operatör.
Vid spinal enligt Anestesiform: Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP operation

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
Kunskapsunderlag

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-189

Version: 13.0

Giltig från: 2026-07-27

Giltig till: 2028-07-27