

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2025-02-19

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Giltig till: 2027-02-19

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Exstirpation av cervikala lymfkörtlar, öron – omhändertagande vid operation

Innehållsansvarig:

Suzanne Johansson, Sektionsledare ÖNH operation, SkaS Skövde

Marie-Louise Johansson, Sektionsledare ÖNH anestesi, SkaS Skövde

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin, ersätter tidigare standardvårdplan

- Lymfkörtelekstirpation, ÖNH – SVP operation

Bakgrund och syfte

Tillämpas i Skövde

Omhändertagande av patient som ska genomgå exstirpation av cervikala lymfkörtlar.

Ingreppet innebär att man via ett hudsnitt opererar bort en lymfkörtel på halsen och skickar denna för undersökning.

Förutsättningar

Förberedelse av sal

Utrustning och placering

- Sug och diatermi vid fotändan
- Lila kudde som klipps till lite.
- Harmonic GEN 11

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: 40 minuter

Operationsmarkering: Ja

Preoperativ provtagning: Ja, blodstatus (ej äldre än 3 mån) + blodgruppering enligt [Preoperativa prover ÖNH operation](#).

Patientpositionering: Ryggläge. Patienten läggs långt ut på operationsbordet på den sidan som ska opereras. Armen på operationssidan i armskena, andra armen på armbord. Ögonskälla på operationssidan. Huvudet vinklat så operationsområdet bjuder sig. Se till att det undre örat ligger bra.

Monitorering: [Övervakning under anestesi \(vgregion.se\)](#), BIS

Anestesimetod: [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#), oral intubation. Tuben fixeras i mungipan på den sida som inte ska opereras. Operatören lokalbedövar peroperativt. Ingreppet ger som ingen postoperativ smärta. Således inget opiatbehov inför väckning utan räcker med Dynastat.

Blåskontroll: [Blåstappning vid anestesi \(vgregion.se\)](#)

Hudvård: Håravkortning vid behov

Antibiotika: Nej

Lokalanestesi: Ja, Marcain-adrenalin 2,5 mg/ml

Specifikt för ingreppet: Preparatet ska gå torrt till patologen. Måste lämnas före kl. 14.00 må-tors och före kl. 12.00 på fredagar. Vid operation efter kl. 14.00 må-tors skickas preparatet till patologen där det läggs i Cellwash och klarar sig 24 timmar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63),
Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-210

Version: 1.0

Giltig från: 2025-02-19

Giltig till: 2027-02-19