

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2025-02-19

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Giltig till: 2027-02-19

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Abdominell hysterektomi - omhändertagande vid operation

## **Innehållsansvariga:**

Elin Fång, sektionsledare gynekologi, operation SkaS Skövde

Therese Johansson, sektionsledare gynekologi, anestesi SkaS Skövde

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin, ersätter tidigare standardvårdplaner

- Hysterektomi, abdominell (benign) – SVP operation
- Hysterektomi, abdominell (malign) – SVP operation

## Bakgrund och syfte

Tillämpas i Skövde

Omhändertagande av patient som ska genomgå abdominell hysterektomi malign/benign.

## Förutsättningar

### Förberedelse av sal

Koppla en serres measuringcup på sugen inför eventuell buksköljvätska. Preparatetiketter från endoskopiförrådet.

### Utrustning och placering:

Diatermiapparat med sug och Ligasure.  
Värmemössa.

## Arbetsbeskrivning

**Förväntad operationstid:** Cirka 2 timmar.

**Sidomarkering:** Nej

**Preoperativ provtagning:** [Provtagning - preoperativ \(vgregion.se\)](#)

**Patientpositionering:** Planläge. Armarna på armbord. Benremmar.

**Monitorering:** [Övervakning under anestesi \(vgregion.se\)](#)

Temperaturmätning via esofagus.

**Anestesimetod:** Intubation och spinal-Morfin enligt:

[Abdominell och laparoskopisk hysterektomi - anestesi](#)

Större ingrepp: EDA i kombination med Intubation och Sevoflurane/Fentanyl.

[Generell anestesi med larynxmask - SVP operation](#)

[Generell anestesi med intubation - SVP operation](#)

[Generell anestesi med intubation och epiduralanestesi - SVP operation](#)

[Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP operation](#)

Eventuellt opiat/NSAID

**Blåskontroll:** KAD [Kateterisering av urinblåsa vid gynekologisk operation - omvårdnad \(vgregion.se\)](#)

**Hudvård:** Navelvård och tvätt med klorhexidinsprit.

**Antibiotika:** Ja, enligt [Antibiotikaprofylax inom gynekologi \(vgregion.se\)](#)

**Lokalanestesi:** Ja, 20 ml Marcain-adrenalin 2,5mg/ml i samband med suturering.

**Specifikt för ingreppet:** Preparatet ska vägas.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-218

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-02-19

**Giltig till:** 2027-02-19