

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2025-02-27

Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare

Giltig till: 2027-02-26

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Vaginala ingrepp - omhändertagande vid operation

Innehållsansvarig:

Elin Fång, sektionsledare operation, Skas Skövde.

Therese Johansson, sektionsledare anestesi, Skas Skövde.

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin, ersätter tidigare standardvårdplan.

Sammanslagning med tidigare SVP vaginal hysterektomi.

Bakgrund och syfte

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande av patient som ska genomgå en vaginal hysterektomi och/eller prolaps.

Förberedelse av sal

Utrustning samt placering:

Hydrauliska benstöd. Motordelen nedanför plinten. Gynbord för vaginala ingrepp.

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: Cirka 1,5 - 2 timmar.

Operationsmarkering: Nej.

Preoperativ provtagning: [Provtagning - preoperativ](#)

Patientpositionering: Planläge med hydrauliska benstöd.

[Benstöd - förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

Placera patienten långt ned på operationsbordet, rumpan ska ligga ca 10 cm utanför operationsbordet. Armarna på armbord.

Monitorering: [Övervakning under anestesi](#)

Anestesimetod: Vid generell anestesi enligt: [Generell anestesi med larynxmask - SVP operation](#), TIVA enligt: [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#), alternativt

Spinal enligt: [Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP operation](#), alternativt lokalanestesi med eventuell sedering.

Vid generell anestesi opiat och eventuellt NSAID. Lokalanestesi läggs av operatören.

Blåskontroll: KAD sätts sterilt i samband med sterildrapering. Tänk på att tömma blåsan helt i samband med katetersättning innan den fixeras bort från operationsfältet.

[Kateterisering av urinblåsa vid gynekologisk operation - omvårdnad](#)

Hudvård: Hårvorkning. Descutan vaginalt och analt. Klorhexidinsprit övriga hudområden, undvik dock slemhinnor.

Antibiotika: Ja, vid vaginal hysterektomi. [Antibiotikaprofylax inom gynekologi](#)

Lokalanestesi: Ja, Carbocain-adrenalin 5 mg/ml blandas med hälften NaCl.

Specifikt för ingreppet: Gynbord för vaginala ingrepp, sänk inte bordet utan samråd med operatören.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-222

Version: 1.0

Giltig från: 2025-02-27

Giltig till: 2027-02-26