

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-02

Giltig till: 2028-03-02

Transuretrala ingrepp - omhändertagande vid operation

Innehållsansvarig:

Elin Fång, sektionsledare operation, Skas Skövde

Therese Johansson, sektionsledare anestesi, Skas Skövde

Förändringar sedan föregående version

Ändring av mening angående spoldropp under rubriken specifikt för ingreppet.

Bakgrund och syfte

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande av patient som ska genomgå transuretralt ingrepp.

Förberedelse av sal

Utrustning samt placering: Hydrauliska benstöd. Motordelen nedanför plinten. Diatermiapparat med sug alt. Neptune. Urologstapel + kamera vid patientens högra sida. Varma spolvätskor.

Vid operation på uretär även C-båge på patientens vänstra sida, eventuellt laser.

Utförande

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: Stor variation, 15 - 120 minuter.

Operationsmarkering: Nej.

Preoperativ provtagning:

[Provtagning - preoperativ \(vgregion.se\)](#)

Patientpositionering: Rygggläge med hydrauliska benstöd, rumpan långt ner. [Benstöd - förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom \(vgregion.se\)](#)

Armarna på armbord.

Monitorering:

[Övervakning under anestesi \(vgregion.se\)](#)

Anestesimetod: Larynxmask eller spinal enligt:

[Generell anestesi med larynxmask - SVP operation \(vgregion.se\).](#)

[Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP operation \(vgregion.se\)](#)

[Propofol - Remifentanyl \(Ultiva\) - TCI \(vgregion.se\),](#)

alternativt: Sevofluran/Fentanyl

Vid generell anestesi opiat och eventuellt NSAID.

Blåskontroll: Eventuellt KAD postoperativt.

Hudvård: Descutan

Antibiotika: -

Lokalanestesi: Xylocaingel 2%

Specifikt för ingreppet:

Vid TUR-P se även; [TUR-syndrom - dagkirurgi \(vgregion.se\)](#).

Mätning balans på spoldropp vid behov, efter operatörens önskemål.

Eventuellt spoldropp postoperativt.

[Trombosprofylax vid urologisk kirurgi](#)

Datum:

Pat ID:

Spoldropp in		Spoldropp ut	Balans
1	3000 ml	ml	ml
2	3000 ml	ml	ml
		ml	ml
3	3000 ml	ml	ml
4	3000 ml	ml	ml
		ml	ml
5	3000 ml	ml	ml
6	3000 ml	ml	ml
		ml	ml
7	3000 ml	ml	ml
8	3000 ml	ml	ml
		ml	ml
Totalt:		ml	ml

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-226

Version: 3.0

Giltig från: 2026-03-02

Giltig till: 2028-03-02