

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-19

Giltig till: 2027-11-18

Ryggoperation – fusion i ländryggen – omhändertagande vid operation

Innehållsansvariga:

Daniel Apel, sektionsledare ortopedi, operation SkaS Skövde

Sara Söderqvist, sektionsledare ortopedi, anestesi SkaS Skövde

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin, ersätter tidigare standardvårdplan.

Bakgrund

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande av patient som ska genomgå fusion i ländryggen.

Förutsättningar

Förberedelse av sal

Utrustning och placering

- Hybridsal 8 med salens tillhörande plantopp. Röntgenrobot.
- Sug och diatermi vid fotändan av patienten.
- Bair-hugger ställs vid fotändan.
- H-kuddar.
- Gula runda knäkuddar.
- Gelkuddar (De för fötter/anklar).
- Ansiktsmask med tillhörande spegel.
- Kuddarna som hör till de ”vanliga” armborden används till armarna. **Se bild**
- Benremmar för att hålla ihop armarna och till benen.
- Armskydd från pink-pad för att hålla ihop alla slangar.

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: 120-210 minuter

Operationsmarkering: [Sidomarkering av pariga organ preoperativt](#)

Preoperativ provtagning: [Provtagning - preoperativ](#)

Patientpositionering:

H-kuddar för patienter som ska operera fusion i bukläge. Vanligtvis används de grå kuddarna som är rekommenderade, men finns även gula kuddar som är mjukare vid tunna sköra patienter. Viktigt att patientens buk ej ligger mot operationsbordet.

Viktigt att det är fritt för röntgenrotation så inga slangar får hänga löst. Se bild för patientpositionering. (**Bild skickas separat**)

Monitorering: [Övervakning under anestesi](#)

Anestesimetod: Generell anestesi med gas.

Blåskontroll: [Blåstappning vid anestesi](#)

Förväntad lång operationstid så här sätts tempkateter preoperativt.

Hudvård: Håravkortning vid behov, klorhexidinsvamp, klorhexidinsprit.

Antibiotika: Nej/Ja vid ordination

Lokalanestesi: Kan eventuellt läggas i hudsnittet efter avslutad operation, fråga operatör.

Specifikt för ingreppet: Artärnål och noradrenalin.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-246

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-19

Giltig till: 2027-11-18