

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2026-03-02

Innehållsansvar: Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-02

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Rektumamputation, laparoskopisk – omhändertagande vid operation

Innehållsansvariga:

Monica Nielsen, sektionsledare kirurgi, operation SkaS Skövde

Thomas Karlberg, sektionsledare kirurgi, anestesi SkaS Skövde

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin, ersätter tidigare standardvårdplan.

Bakgrund och syfte

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande av patient som ska genomgå operation med laparoskopisk rektumamputation.

Förberedelse av sal

Utrustning och placering

PulsioCare, SpO₂-Öronsensor, Artip Solo, Ligasure.

Operationsbordet förkortas eventuellt ovan plint, avhängigt patientlängd och motorplatta nedan plint med hydrauliska benstöd.

PinkPad.

Laparoskopistapel på patientens högra sida.

Metylenblått, vit korkplatta och Sealsafepåse till preparat.

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: Ca. 240-450 min.

Operationsmarkering: Stomimarkering bör finnas.

Patientpositionering:

Seans 1. Sy ihop anus: Båda armarna på armbord. Hydrauliska benstöd.

Seans 2. Ryggläge patienten lyfts till läge med huvudet på huvudplattan, justera PinkPad till optimalt läge. Båda armar utmed sidan, polstringsvadd används för att hålla droppslangar och monitoreringssladdar på plats och undvika tryck. "Flowkeeper" och förlängningar på droppslangar. Tänk på att TCI-set och eventuellt Noradrenalin kopplas närmast patienten, ej efter förlängningen (1-meters förlängning rymmer 7 ml vätska). Stomi och förband sätts på innan vändning.

Innan seans 3 sätts KAD på män och kvinnor vaginaltvättas.

Seans 3 bukläge. Dra över patienten till sängen, vänd över till bukläge på operationsbordet, patientens ljumske ska ligga i nivå med där bordet knickas mellan plint och motorplatta (patientens lår ska ligga mot motorplattan), tjock geldyna i skarven. Förslut ögonen med ögontejp/ögonförband. Ansiktet i ansiktsmask för bukläge, eventuell kudde under bröstet för bra nackposition. Armarna på armbord med kuddar. Bordet knickas & tippas. Dra isär benplattorna. Kudde och/eller gelskydd till anklarna, fäst med remmar.

Kontrollera så att det är slätt under patienten och att dränageslangar, kopplingar och stomipåse ligger fritt.

[Bilder och förklaring till patientupplägget.](#)

Anestesimetod: Enligt ordination, vanligtvis TCI-Intubation + Morfinspinal

[Generell anestesi med intubation - SVP operation](#)

[Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

[Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP operation](#)

Monitorering: [Övervakning under anestesi](#)

Tempmätning via esofagus, artärnål, PulsioCare, öronsensor för SpO₂-mätning,

Restriktiv infusionsbehandling gäller enligt:

[Esofagusdoppler \(CardioQ-ODM+\) - målstyrd vätskebehandling](#)

[ERAS vid kolorektal kirurgi - anestesi](#)

[ERAS vid kolon- och tunntarmskirurgi](#)

Perioperativ provtagning: [Provtagning - preoperativ](#)

KAD/Blåskontroll: Cystofix

[Blåstappning vid anestesi](#)

Hudvård: Håravkortning, navelvård. Tvätta med klorhexidinsprit & Descutan

Antibiotika: Ja, enligt ordination.

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

Lokalanestesi: Marcain-adrenalin 2,5 mg/ml 50 ml

Specifikt för ingreppet:

Patienten vårdas enligt ERAS-konceptet.

Bair Hugger, värmemössa och vätskevärmare.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Kom ihåg att tömma ventrikeln, innan operationsstart.
Postoperativ smärtlindring enligt [ERAS vid kolorektal kirurgi - anesthesi](#)

Seans 1.: Descutantvätt före och efter ihopsyning.

Seans 3.: Descutantvätt perianalt före klorhexidinspritsvätt.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-262

Version: 2.0

Giltig från: 2026-03-02

Giltig till: 2028-03-02