

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2026-03-02

Innehållsansvar: Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-02

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

# Hudförändring, malignt melanom med eller utan sentinel node, lymfkörtelexstirpation och delhudstransplantation – omhändertagande vid operation

## **Innehållsansvariga:**

Thomas Karlberg, sektionsledare kirurgi, anesthesi SkaS Skövde

Monica Nielsen, sektionsledare kirurgi, operation SkaS Skövde

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin. Ersätter tidigare standardvårdplaner.

## Bakgrund och syfte

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande av patient som ska genomgå operation av:

Hudförändring, malignt melanom med eller utan sentinel node, lymfkörtelexstirpation och delhudstransplantation.

## Förberedelse av sal

### Utrustning och placering

Neoprobe 2000 (sentinel node)

## Arbetsbeskrivning

**Förväntad operationstid:** 30-120 minuter.

**Sidomarkering:** Ja och eventuell sentinel node.

[Sidomarkering av pariga organ preoperativt](#)

### **Preoperativ provtagning:**

## Provtagning - preoperativ

### **Patientpositionering:**

Operationsläge beroende på tumörens lokalisering:

Ryggläge: Båda armarna på armbord, benrem.

Sidoläge: Undre armen på armbord, övre armen på kuddar, kudde mellan knän, benrem.

Bukläge: Kudde under bröstet, armarna på armbord, huvudet i sidoläge på kudde alternativt i ansiktsmask, benrem med kudde under skenben.

Vid sentinel node i axill, lägg den opererade sidan så långt ut på kanten som möjligt.

### **Monitorering:** Övervakning under anestesi

**Anestesimetod:** Vanligtvis Larynxmask.

Generell anestesi med larynxmask - SVP operation

Propofol - Remifentanyl (Ultiva) - TCI

Generell anestesi med intubation - SVP operation

Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP operation

**Blåskontroll:** Ja

Blåstappning vid anestesi

### **Hudvård:**

Om sentinel node utförts ring operatör för att spruta Blue Patente innan steriltvätt.

Tvätta med Klorhexidinsprit.

**Antibiotika:** Nej

**Lokalanestesi:** Marcain-adrenalin 2,5mg/ml.

### **Specifikt för ingreppet:**

Vid sign-in ska det förtydligas hur preparat ska handhas, vid misstanke om lymfom lämnas preparatet "torrt" till patologen.

Vid hudtransplantation finns batteriet till dermatomen på uppställningsplats 2.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-263

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-03-02

**Giltig till:** 2028-03-02