

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-20

Giltig till: 2028-04-20

# Öppen prostatektomi, adenomenukleation – omhändertagande vid operation

## Innehållsansvariga:

Elin Fång, sektionsledare urologi, operation SkaS Skövde

Therese Johansson, sektionsledare urologi, anestesi SkaS Skövde

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin – ersätter tidigare standardvårdplan *Adenomenukleation* och *Prostatektomi, radikal*

## Bakgrund och syfte

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande av patient som ska genomgå öppen prostatektomi/adenomenukleation.

## Förberedelse av sal

### Utrustning och placering:

Operationsbordet: motorplattan placeras nedanför plinten.

Vätskevärmare Ranger. Bairhugger, värmestrumpor och värmemössa.

## Arbetsbeskrivning

**Förväntad operationstid:** Cirka 3 timmar.

**Operationsmarkering:** Nej

**Preoperativ provtagning:** [Provtagning - preoperativ](#)

**Patientpositionering:** Ryggläge med operationsbordet knickat i höfthöjd.

Armarna på armbord. Benremmar.

**Monitorering:** [Övervakning under anestesi](#)

Temperaturmätning via esofagus.

**Anestesimetod:**

[Generell anestesi med intubation - SVP operation](#)

TIVA enligt [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Spinal enligt anestesiform morfinspinal:

[Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP operation](#)

Vid prostatektomi se: [Prostatektomi, öppen - anestesi](#)

Targiniq och Alvedon ges som premedicinering på avdelningen.

Läkemedel att ge innan väckning; Catapresan, Oxycodone och eventuellt Dynastat när anastomoserna börjar sys, tar cirka 30–45 minuter.

RASP: Dessa patienter får Furix intravenöst när man sytt igen blåsan, ges enligt ordination av operatör. Ger forcerad diures och minskar risken för stopp i KAD. Det ges ytterligare en dos Furix 2 timmar postoperativt.

**Blåskontroll:**

*Prostatektomi:* KAD.

*Adenomenukleation:* 22 Ch 3-vägs KAD från start fylls kuffen med 20 ml sterilt vatten, ta upp detta i sign-in då operatören får besluta om kuffen ska fyllas ytterligare mot slutet. Eventuellt kopplas spoldropp under operationen.

**Hudvård:** Håravkortning. Descutan. Navelvård och tvätt med klorhexidinsprit. Skrotum och penis sterilklädd.

**Antibiotika:** Nej

**Lokalanestesi:** Ja, 20 ml Marcain-adrenalin 2,5mg/ml i samband med suturering.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Elin Fång, (elila35), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-267

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-04-20

**Giltig till:** 2028-04-20