

Käkkirurgiska operationer – omhändertagande vid operation

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin, ersätter tidigare standardvårdplan.

Bakgrund

Tillämpas i Skövde

Käkkirurgiska ingrepp utförs av käkkirurg som opererar tillsammans med tandsköterskor från käkkirurgin. Vid operation för käkanomali korrigeras felställningar som stora under- eller överbett. Andra vanliga operationer är operativ extraktion av visdomstand, käkresektion samt operation av käkfraktur. En del operationer (t ex FESS med Caldwell Luc) sker i samarbete med ÖNH-läkare. Vid dessa krävs fullt operationslag.

Förberedelse av sal

Utrustning och placering

- Huvudändan mot dörren med något snedställt operationsbord.
- Smal huvudplatta.
- Personal från käkkirurgin ansvarar för att ta med och plocka fram den utrustning de behöver.

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: Varierar beroende på ingrepp, se uppskattad tid för den enskilda patienten. En anomalioperation tar ca 90-210 minuter medan en operativ tandextraktion tar cirka 30 minuter.

Operationsmarkering: Nej

Preoperativ provtagning: Ja, enligt [Provtagning - preoperativ](#)

Patientpositionering: Ryggläge, högt upp på bordet. Vänster arm i armskena, höger arm på armbord. Tejpade ögon samt ögonskållor med kompresser under.

Monitorering: [Övervakning under anestesi](#), BIS

Anestesimetod: [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#).

Övriga läkemedel:

- Paracetamol och Oxycontin i premedicinering
- Betapred vanligen 8 mg som PONV-profylax samt för att minska svullnad.
- Dynastat 20-40 mg
- Catapresan 1 µg/kg
- Oxycodone
- Eventuellt Ondansetron 4 mg iv då PONV är besvärande efter käkoperation

Nasal intubation med förformad tub avsedd för nasalt bruk, vanligen en storlek mindre än vid oral intubation. Narkoslang bakåt över pannan och fästs med peang. Svalgpäckning anbringas samt tas bort av personal från käkkirurgin. Svalgpäck in och ut dokumenteras i Orbit under "Luftvägskontroll" och ska tas upp i Checklista för säker kirurgi.

Blåskontroll: [Blåstappning vid anestesi](#)

Hudvård: Steriltvättas och draperas av personal från käkkirurgin

Antibiotika: Ja, enligt ordination

Lokalanestesi: Ja, peroperativt av operatör

Specifikt för ingreppet: Under vissa operationer sätter man "pinne i pannan" på patienten. Detta som riktmärke för operatör under operationen. Efter en del käkoperationer "fixeras" patientens käkar med gummiband. Dessa kan enkelt klippas upp vid behov. Gärna höjd huvudända efter operation för att motverka svullnad efter större käkoperation. Eventuell kylmask anbringas av käkkirurgins personal innan patienten lämnar operationssalen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-281

Version: 1.0

Giltig från: 2026-09-15

Giltig till: 2028-09-15