

Terapeutisk injektion av botox – omhändertagande vid operation

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Bakgrund

Tillämpas i Skövde

Terapeutisk injektion av Botox kan ges vid spasticitet och muskelryckningar. Patienter som inte tolererar att detta görs vaket kan behöva lätt sedering på operation.

Förberedelse av sal

Utrustning och placering:

Ingen specifik utrustning. Personal från rehabmottagning alternativt barndagvård har med sig sprutor med läkemedel.

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: Ca 10 minuter

Operationsmarkering: Nej

Preoperativ provtagning: Nej

Patientpositionering: Beror på var injektionen ska ske. Vuxna patienter som ska få injektion av botox i armar och/eller händer kan sitta kvar i eventuell rullstol under hela förloppet.

Monitorering: [Övervakning under anestesi](#)

Anestesimetod: Lätt propofolsedering, med fördel via intermittent intravenös injektion. O2-grimma vid behov. Vid förväntat längre sederingsbehov (ovanligt om endast injektion av botox) sedering enligt [Propofolsedering - anestesi](#) eller [Propofolsedering - barn](#).

Blåskontroll: [Blåstappning vid anestesi](#)

Hudvård: Steriltvättas ej, endast desinfektion insticksställe

Antibiotika: Nej

Lokalanestesi: Nej

Specifikt för ingreppet: Terapeutisk injektion av botox utförs av neurolog som kommer till operations tillsammans med sjuksköterska från rehabmottagningen. På barn utförs injektionen vanligen av barnortoped och assisteras då av sjuksköterska från barndagvården. Vuxna patienter kommer via dagkirurgin medan barn kommer via barndagvården.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-282

Version: 1.0

Giltig från: 2026-09-15

Giltig till: 2028-09-15