

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Preaurikulärt bihang, fistel – SVP operation

Innehållsansvarig

Marie-Louise Johansson, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Suzanne Johansson, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Uppdatering av länk under sömn.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation för preaurikulär fistel eller bihang.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t.

generell anestesi

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi-larynxmask – SVP operation](#)[Barnanestesi – SVP operation](#)

Tuben fixeras i motsatta sidans mungipa

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skada urinblåsa

r.t.

överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan se [Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada

r.t.

förflyttning till/från operationsbord

Oförmåga att stänga ögonlocken

r.t.

anestesi

Risk för tryck- och nervskada

r.t.

kroppsläge

Omvårdnads mål

Ingen corneaskada
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp. Anestesiapparaten på motsatt sida.
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Huvudet på ESWELL-kudde. Använd hygienunderlägg istället för örngott på grund av glidrisk.
Armen närmast operatör i armskena
Andra armen på armbord
Kudde under knän
Benremmar

-speciell omvårdnad

Tejpa ögonen med cornea care.
Patienten rakas runt örat, håret fixeras med surgifixmossa och tejp
Se till att det undre örat ligger bra

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. yttlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) -TCI](#) alternativt
[Total Intravenös Anestesi \(TIVA\) för barn](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Lokalanestesi
NSAID
Eventuellt opiat

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-46

Version: 16.0

Giltig från: 2024-10-22

Giltig till: 2026-10-22