

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-14

Giltig till: 2026-10-14

Spinal stimuleringsutrustning – SVP operation

Innehållsansvariga:

Marie-Louise Johansson, sektionsledare Anestesi SkaS Skövde
Suzanne Johansson, sektionsledare Operation SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet i väntan på revidering.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med spinal stimuleringsutrustning eller spinal injektionsport.

Arbetsbeskrivning

Andning/cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Risk för ofri luftväg	r.t.	sedering, generell anestesi
Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	sedering, generell anestesi

Omvårdnads mål

Fri luftväg.

Tillfredsställande ventilation

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Lokalanestesi, eventuellt med sedering eller

[Generell anestesi med larynxmask-SVP operation](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa vid anestesi
---------------------------	------	------------------------------

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

BladderScan, se [Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	Kroppsläge
Oförmåga att stänga ögonlocken	r.t.	Anestesi

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Ingen corneaskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Pacemakertopp på sal 16, plantopp på annan sal

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra

Vid rygläge: Huvudet på ESHELL-kudde. Använd hygienunderlägg istället för örngott på grund av glidrisk.

Vid sidoläge: ESHELL-kudde eller vanlig huvudkudde. Kudde eller eventuellt mjukt täcke mellan knän samt eventuellt kudde mellan armar. Använd eventuellt ryggplattan som används vid barngastroskopier som stöd.

Vid bukläge: Gelkudde med ansiktet nedåt om operation i nackhöjd. Om operation i ländrygg kan ansiktet ligga åt sidan. Kilkudde vid naveln vid operation i ländrygg. Eventuellt kudde under bröstet.

Benremmar

Vid oklarhet diskutera operationsläget med operatör

-speciell omvårdnad

Tejpa ögonen med cornea care

Antibiotika enligt ordination

Septocoll

Tegaderm Pad som förband

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. yttlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Vid generell anestesi: [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\)- TCI](#) eller

Gasanestesi med Fentanyl enligt Anestesiform: [Generell anestesi med larynxmask – SVP operation](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. Ingreppet, sensitiserad patient

Omvårdnads mål

Vas mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Lokalanestesi

Smärtstillande enligt ordination

Ingrepp:

Inläggande av spinal stimuleringsutrustning seans 1

Bukläge

Vaken eller mycket lätt sederad patient

C-båge

Produktionsspecialist från firma med

Personal från smärtenheten med för att sköta inställningar på stimuleringsutrustningen

Inläggande av spinal stimuleringsutrustning seans 2

Sidoläge, vilken sida beror på batteriets placering

Djupare sedering eller generell anestesi med larynxmask

Spinal stimuleringsutrustning – Revision av batterificka

Rygläge eller sidoläge om batteriet är placerat på magen

Bukläge om batteriet är placerat på flanken

Djupare sedering eller generell anestesi med larynxmask

Spinal stimuleringsutrustning – Elektrodrevision

Bukläge
C-båge

Explantation av spinal stimuleringsutrustning

Bukläge
Generell anestesi

Inläggande av spinal injektionsport

Sidoläge, gärna vänster om ingen kontraindikation
Vaken eller lätt sederad patient
C-båge

Implantation av perifer nervstimulator – Seans 1

Läge beroende på vart stimulatoren ska placeras
Diskutera med operatör vid oklarhet
Eventuellt ultraljud, hämtas av operatör
Vaken patient

Implantation av perifer nervstimulator – Seans 2

Läge beroende på stimulatorns placering
Diskutera med operatör vid oklarhet
Eventuellt ultraljud, hämtas av operatör
Vaken patient

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-51

Version: 5.0

Giltig från: 2024-10-14

Giltig till: 2026-10-14