

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-21

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-21

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Barnoperation fimosis, hydrocele, testistorsion – SVP operation

Innehållsansvariga:

Elin Fång, sektionsledare, operation SkaS Skövde
Therése Johansson, anesthesi SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet i väntan på revidering.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för barn som ska genomgå operation för fimosis, hydrocele eller testistorsion.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anesthesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud och sårexponering

Omvårdnads mål

Fri luftväg
MAP mer än 65
Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anesthesi med larynxmask-SVP operation](#) eller

[Generell anesthesi med intubation – SVP operation](#)

[Barnanesthesi - SVP operation](#)

[Engångsslangar, uppkoppling av filter och samplingstycke - barn](#)

[Provtagning preoperativ](#)

Varmt på salen

-läkemedelshantering

Ringer-Acetat

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa
---------------------------	------	-----------------

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesigas/Fentanyl enligt Anestesiform: Sevorane-mask-larynxmask spontan andning alternativt Anestesiform: Fentanyl

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Eventuellt Opiat och/eller NSAID

Eventuell lokalbedövning läggs av operatör

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-6

Version: 11.0

Giltig från: 2024-10-21

Giltig till: 2026-10-21