

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Adenotonsillektomi – SVP operation

Innehållsansvariga

Marie-Louise Johansson, sektionsledare anesthesi, SkaS Skövde
Suzanne Johansson, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Mindre förändringar under hud/vävnad och smärta.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå adenotonsillektomi.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Barnanestesi – SVP operation](#)

[Generell anesthesi-intubation – SVP operation](#)

Oralintubation tuben fixeras mitt på underläppen

Slangarna placeras rakt fram över bröstet

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan enligt [Blåstappning vid anesthesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Oförmåga att stänga ögonlocken r.t. anesthesi

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Omvårdnads mål

Ingen corneaskada

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp. Anestesiapparaten på patientens vänstra sida.

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Huvudet på ESWELL-kudde, rund ESWELL-kudde till barn. Använd hygienunderlägg istället för örngott på grund av glidrisk.

Huvudplattan tippad

Vänster arm på armbord och höger arm i armskena

Kudde under knäna

Benremmar i möjligaste mån

-speciell omvårdnad

Tejpa ögonen med cornea care

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. yttlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) – TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Risk för sväljningssvårigheter r.t. sårsmärta

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Fentanyl

Betapred

Dynastat

Paracetamol om ej givet i premedicinering

Eventuellt Catapresan

Eventuellt opiat

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-70

Version: 12.0

Giltig från: 2024-10-22

Giltig till: 2026-10-22