

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-15

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-15

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

AV-fistel – SVP operation

Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde
Thomas Karlberg, sektionsledare anesthesi, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Ändringar under smärta.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med arteriovenös fistel (AV-fistel).

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t.

generell anesthesi

Risk för hypovolemi

r.t.

Blödning

Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Vid anesthesi [Generell anesthesi med larynxmask-SVP operation](#)

TIVA enligt: [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

[Regional anesthesi, blockad, lokalanesthesi - SVP operation](#)

Lokal anesthesi – "Skövde anestesiblandning" [Lokalanestetika med natriumbikarbonat - tillblandning](#)

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

[Provtagning preoperativ](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skada urinblåsa

r.t.

överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan enligt [Blåstappning vid anesthesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	Kroppsläge
Omvårdnads mål		
Hel och oskadad hud		
Ingen nervskada		

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp eller gyn/urotopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Den arm som ska opereras på fiolarmbord (lilla/korta fiolarmbordet)

Den andra armen på armbord

-speciell omvårdnad

Manschett för blodtomt fält så högt upp på armen som möjligt enligt styrdokument [Blodtomt fält vid operation](#)

Om PTFE-graft inte är planerad från början gäller skylt "inget onödigt spring" från och med när graften tas upp och då gäller munskydd för alla på salen.

Eventuell avlösning under operationen diskuteras med ansvarig kirurg.

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Vid anestesi enligt anestesiform: [Generell anestesi med larynxmask-SVP operation](#)

alternativt [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för perioperativ smärta r.t. Ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Vanligtvis plexus.

Eventuell lokalanestesi läggs av operatör

Generell anestesi

Eventuellt opiat

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-81

Version: 17.0

Giltig från: 2024-10-15

Giltig till: 2026-10-15