OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VE An Op IVA
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-12
Giltig till: 2028-07-21

AV-fistel – SVP operation

Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde
Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Ändringar under smärta.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med arteriovenös fistel (AV-fistel).

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation
Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	Blödning

Omvårdnadsmål
Fri luftväg
MAP mer än 65

Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
Vid anestesi Generell anestesi med larynxmask - omhändertagande vid operation
TIVA enligt: Propofol - Remifentanil (Ultiva) - TCI
Regional anestesi, blockad, lokalanestesi - SVP operation
Lokal anestesi – ”Skövde anestesiblandning” Lokalanestetika med natriumbikarbonat - tillblandning
Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgin
Provtagning preoperativ

Elimination
Omvårdnadsdiagnos

Risk för skada urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa

Omvårdnadsmål
Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder
Bladderscan enligt Blåstappning vid anestesi

Hud/Vävnad
Omvårdnadsdiagnos

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	Kroppsläge

Omvårdnadsmål
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder
-miljö
Plantopp eller gyn/urotopp
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Den arm som ska opereras på fiolarmbord (lilla/korta fiolarmbordet)
Den andra armen på armbord
-speciell omvårdnad
Manschett för blodtomt fält så högt upp på armen som möjligt enligt styrdokument Blodtomt fält vid operation
Om PTFE-graft inte är planerad från början gäller skylt "inget onödigt spring" från och med när graften tas upp och då gäller munskydd för alla på salen.
Eventuell avlösning under operationen diskuteras med ansvarig kirurg.

Sömn
Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi

Omvårdnadsmål
God sömn

Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
Vid anestesi enligt anestesiform: Generell anestesi med larynxmask - omhändertagande vid operation alternativt Propofol - Remifentanil (Ultiva) - TCI

Smärta
Omvårdnadsdiagnos

Risk för perioperativ smärta	r.t.	Ingreppet

Omvårdnadsmål
VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
Vanligtvis plexus.
Eventuell lokalanestesi läggs av operatör
Generell anestesi
Eventuellt opiat

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-81

Version: 19.0

Giltig från: 2026-11-12

Giltig till: 2028-07-21