

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård  
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare  
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef  
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-21

Giltig till: 2026-10-21

# Barnoperation bråck, retentio testis, hydrocele – SVP operation

## Innehållsansvariga

Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde  
Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Ändring under andning/cirkulation från Ringer-Acetat till Plasmalyte. Tillägg under hud/vävnad.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå barnoperation av bråck, retentio testis, hydrocele.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	Blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud- och sårexponering

#### Omvårdnads mål

Fri luftväg  
MAP mer än 65  
Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Generell anestesi med larynxmask-SVP operation](#)

[Barnanestesi - SVP operation](#)

[Engångsslangar, uppkoppling av filter och samplingstycke – barn](#)

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

[Provtagning preoperativ](#)

Varmt på salen

##### -läkemedelshantering

1:a hand Benelyte  
2:a hand Plasmalyte

### Elimination

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

#### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Blåstappning vid anestesi](#)

### Hud/Vävnad

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. Kroppsläge

#### Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -miljö

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Armar utmed sidan eller på armbord, avhängigt barnets/patientens storlek.

### Sömn

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

#### Omvårdnads mål

God sömn

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -läkemedelshantering

Anestesigas/Fentanyl enligt anestesiform:

[Generell anestesi med larynxmask-SVP operation](#)

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

### Smärta

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. Ingreppet

#### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -läkemedelshantering

Eventuellt Opiat och/eller NSAID

Eventuell lokalbedövning läggs av operatör, om möjligt före operationsstart

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.  
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.  
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013  
Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.  
Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.  
[Kunskapsunderlag](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-85

**Version:** 17.0

**Giltig från:** 2024-10-21

**Giltig till:** 2026-10-21