OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VE An Op IVA
Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-07-23
Giltig till: 2028-07-23

Cystektomi, Brickerblåsa - SVP operation

Innehållsansvarig:

Elin Fång, sektionsledare, operation SkaS Skövde
Therése Johansson, sektionsledare, anestesi SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Tillägg av länk Benstöd - Förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå cystektomi med Brickerblåsa.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation
Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för sviktande cirkulation	r.t.	ingreppet
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud- och sårexponering

Omvårdnadsmål
Fri luftväg
MAP mer än 65
Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
Generell anestesi med intubation och epiduralanestesi – SVP operation
Eventuellt CVK och eventuellt A-nål
Provtagning preoperativ
Tempmätning via esofagus
Bair Hugger, värmemössa och vätskevärmare

Elimination
Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa

Omvårdnadsmål
Ingen blåsskada
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
KAD sätts vid steriltvättning

Hud/Vävnad
Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge
Risk för infektion	r.t.	ingrepp

Omvårdnadsmål
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada
Ingen infektion

Omvårdnadsåtgärder
-miljö
Universaltopp vid cystektomi
Eventuellt hydrauliska benstöd
Benstöd - Förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Operationsbordet knickas i höfthöjd
Båda armarna på armbord
Benremmar
-speciell omvårdnad
Diatermi med biclamp

Sömn
Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi

Omvårdnadsmål
God sömn

Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
Anestesigas/Fentanyl enligt Anestesiform: Desflurane-intubation-kontrollerad andning

Smärta
Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta	r.t.	ingreppet

Omvårdnadsmål
VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
EDA enligt Anestesiform: Epidural

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
Kunskapsunderlag

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-9

Version: 12.0

Giltig från: 2026-07-23

Giltig till: 2028-07-23