

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-15

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-15

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Bukreduktionsplastik – SVP operation

Innehållsansvariga

Thomas Karlberg, sektionsledare anesthesi, SkaS Skövde
Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängs i väntan på revidering.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt SVP för patient som ska genomgå operation med bukreduktionsplastik.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t.

generell anesthesi

Risk för hypovolemi

r.t.

Blödning

Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anesthesi med larynxmask-SVP operation](#) alternativt

[Generell anesthesi med intubation – SVP operation](#)

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

[Provtagning preoperativ](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa

r.t.

överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD, kvarsittande över natten

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada

r.t.

förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada

r.t.

Kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Universaltopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Båda armarna på armbord

Benremmar

Kudde under knän

-speciell omvårdnad

Vid buksuturering vinkla patientens ben uppåt

Korsett och kudde under knän postoperativt som ska vara medskickad från avdelning samt gördel

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness

r.t.

ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

TIVA enligt: [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

[Generell anestesi med larynxmask-SVP operation](#)

Fentanyl alternativt [Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta

r.t.

Ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Opiat. Eventuell lokalanestesi läggs av operatör

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-90

Version: 13.0

Giltig från: 2024-10-15

Giltig till: 2026-10-15