

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-23
Giltig till: 2027-05-23

Central venkateter (CVK) och central dialyskateter (CDK) – SVP operation

Innehållsansvariga:

Marie-Louise Johansson, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde
Suzanne Johansson, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Uppdatering av länk under Sömn.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska få central venkateter (CVK)/central dialyskateter (CDK).

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. sedering, generell anestesi

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Vanligen lokalanestesi, eventuellt med sedering. Annars [Generell anestesi-larynxmask – SVP operation](#)

[Barnanestesi – SVP operation](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Risk för infektion r.t. ingrepp

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Ingen infektion

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Huvudet på ESHELL-kudde. Använd hygienunderlägg istället för örngott på grund av glidrisk.

Armarna utmed sidorna
Kudde under knän
Benremmar

-speciell omvårdnad

Icke tunnelerad CVK och CDK läggs vanligen på preop.
Tunnelerad CVK och CDK kräver genomlysning och läggs därför på operationssal med ett helt operationslag.

Tänk på att tvätta och klä ett större område vid tunnelering.
C-båge körs in från den sida som inte ska opereras, snett uppåt.

[Implantation - hygienrutiner](#)

-läkemedelshantering

[Antibiotikaprofylax vid implantation och byte](#)

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnadsmål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Vid generell anestesi [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) – TCI](#)

[Total Intravenös Anestesi \(TIVA\) för barn](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnadsmål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Lokalanestesi enligt

[Lokalanestetika med Natriumbikarbonat - tillblandning](#)

[Regional anestesi - blockad, lokalanestesi eller intravenös regional anestesi \(IVRA\) – SVP operation](#)

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63),
Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-93

Version: 13.0

Giltig från: 2025-05-23

Giltig till: 2027-05-23