

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-15

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-15

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

EVAR, hybridgrepp – SVP operation

Innehållsansvariga

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde
Thomas Karlberg, sektionsledare anesthesi, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet med nya länkar.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå EVAR (Endovascular Aortic Repair)-hybridgrepp.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anesthesi
Risk för hypotension	r.t.	ingreppet, generell anesthesi
Risk för blödning	r.t.	Ingreppet
Risk för hypotermi	r.t.	hudexponering, lång operationstid
Risk för infektion	r.t.	invasiv metodik, främmande material

Omvårdnads mål

Fri luftväg
MAP mer än 65
Kroppstemperatur mellan 36,5–37,5 grader
Förebygga infektion

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Patienten går direkt till IVC från avdelningen

-observation/övervakning

Esofagustemp
Artärnål gärna på höger sida
Använd 3-ml-sprutor (ej "respsprutor") till ACT-prover

-speciell omvårdnad

[Generell anesthesi med intubation – SVP operation](#) alternativt

[Generell anesthesi med larynxmask-SVP operation](#)

[Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Bair-Hugger (överkroppstäck) värmemössa

Bas-test

Tre PVK (två med 3-vägsran 90 cm)

-läkemedelshantering

Ringer-Acetat startas på IVC

Noradrenalin startas i samband med induktion

Heparin 5000 IE/ml

Antibiotika vanligtvis Cefuroxim 1,5 g sätts pre-röntgen om ordinerat
[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD sätts på vårdavdelningen

Eventuellt temp – KAD

[Provtagning preoperativ](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från röntgenbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. Kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Röntgenbord

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill röntgenbordet. De får inte haka i varandra.

Vänster arm utmed sidan, höger arm på armbord.

Huvud placeras i blå fixationskudde

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

-speciell omvårdnad

Monitorera med BIS

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. Ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Morfin

Lokalanestesi

EVAR plocklista

Läkemedel finns i apoteket på IVC

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-97

Version: 11.0

Giltig från: 2024-10-15

Giltig till: 2026-10-15