

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Giltig från: 2024-12-03

Innehållsansvar: Ludvig Rydblom, (ludry1), Specialistläkare

Giltig till: 2026-11-30

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Provtagning och behandling innan läkarbesök – akut barnsjukvård

Revideringar i denna version

Justerat länk sid 2.

Bakgrund, syfte och mål

Delegering barnsjuksköterska.

Arbetsbeskrivning

- Allmänt
Alltid kontrollera p-glukos hos svårt sjuka/medtagna barn och när man sticker andra barn för provtagning.
Alla barn som söker akut ska vägas. Barn under 2 år helt nakna.
Övriga barn i endast underkläder
Förberedd för urinprov för barn med feber mindre än 2 år, utan andra fokus vid anamnes eller med buksmärta/urinbesvär.
- Oklar feber
Urinsticka (mittstråleprov) / spara urinprovet
Alvedon/Ipren beroende på om de fått det hemma eller inte.
OBS! Ej NSAID utan läkares ordination till barn med tumörsjukdom.

- Svårt astmaanfall/bronkiolit
Vitala parametrar med Saturation O2 och AF. O2 vid Saturation O2 <92%. Börja med 5 l på mask, 2 l på grimma eller 10 l på tratt och justera enligt svar. Ta blodgas.
Inhalation Ventoline 5 mg/ml: 2 ml deponeras i Maxin. Inhalera i 1 minut till barn <30 kg och 2 minuter till barn >30 kg. Kan upprepas var 20:e minut under den första timmen.
OBS! Syrgasdrivande nebulisator vid Saturation O2 <92%.
Vid mindre påverkade barn kan man i stället ge Ventoline via spacer:
4 puffar till barn under 2 år. 6 puffar till barn över 2 år.
- Kruppanfall
Behandling ges efter läkarbedömning.
- Allergisk reaktion/urtikaria
Betapred 0,5 mg/tablett: ≤ 5 år ges 6 tabletter (3 mg), >5 år ges 10 tabletter (5 mg). Max 10 tabletter.
Oral lösning Aerius (0,5 mg/ml): ges 2,5 ml till barn 1-5 år, tablett Aerius 2,5 mg till barn 6-11 år, alternativt 5 ml oral lösning, tablett Aerius 5 mg till barn >12 år, alternativt 10 ml oral lösning.
- Anafylaxi
Adrenalinpenna (EpiPen) 150 mikrogram administreras intramuskulärt för barn mellan 15 till 30 kg och 300 mikrogram för barn >30 kg. För barn under 15 kg får Adrenalin 1 mg/ml: dos 0,01 ml/kg, max 0,5 ml administreras intramuskulärt. I avsaknad av klinisk förbättring eller om försämring inträffar, kan en andra injektion ges 5-15 minuter efter den första injektionen.
Solu-Cortef i dosen 8 mg/kg, max 200 mg. Administreras intravenöst.
Oral lösning Aerius (0,5 mg/ml): ges 2,5 ml till barn 1-5 år, tablett Aerius 2,5 mg till barn 6-11 år, alternativt 5 ml oral lösning, tablett Aerius 5 mg till barn >12 år, alternativt 10 ml oral lösning. Vid andningsbesvär inhaleras Ventolin, var god se svårt astmaanfall.
- Gastroenterit
Primärt ingen provtagning. Erbjud vatskeersättning. Vid behov rehydrering via sond, var god se separat [styrdokument](#).

- Förstoppning
Vid känd förstoppning och /eller otvetydig anamnes på förstoppning kan klyx ges:
Barn 1–5 år: 120 ml
Barn över 5 år: 120-240 ml
- Diabetesdebut
Emla direkt för ev två PVK.
Provtagning enligt PM för diabetes.
- Krampanfall
Diazepam eller Midazolam/Buccolam ges vid kramp >5 minuter om inte redan givets i ambulans eller hemmet.
Buccolam 5 mg/ml. Fördelas lika innanför båda kinderna.
 - Blå spruta, 5 mg till barn 1-5 år.
 - Lila spruta, 7,5 mg till barn 5-10 år.
 - Orange spruta, 10 mg till barn 10-18 år.Eller Diazepam Klysma:
 - 5 mg till barn mellan 5-11 kg.
- Ont i bröstet
Ta vitala parametrar inklusive blodtryck
EKG

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Ludvig Rydblom, (ludry1), Specialistläkare

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9699-1702881381-123

Version: 7.0

Giltig från: 2024-12-03

Giltig till: 2026-11-30