

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Giltig från: 2025-02-06

Innehållsansvar: Mikaela Bergström, (miks6), Barnsjuksköterska

Giltig till: 2027-02-28

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

# Terbutalin (Bricanyl)- neonatalvård

## Förändringar sedan föregående version

Förlängt giltighetsdatum.

## Bakgrund, syfte och mål

Läkemedels PM neonatalvård.

## Arbetsbeskrivning

### Indikation

Hyperkalemi (S-K >8 med patologiskt EKG).

### Beredning

Injektionsvätska 0,5 mg/ml skall spädas.

### Spädning

1 ml injektionsvätska spädes med 24 ml Glucos 50 mg/ml.

### Erhållen styrka

20 mikrogram/ml.

### Rek.dos

0,1 mikrogram/kg/min = 6 mikrogram/kg/tim som infusion = 0,3 ml/kg/tim. Alternativt 4 mikrogram/kg på 20 minuter i bolusdos.

Se doseringstabell.

### Administrering

Ges som iv. Infusion

### Observera

Infusionen ska inte ges i samma kateter som Tribunatinfusion. Kan ges i NAK om ven ej tillgänglig.

biverkning i form av takykardi är dosberoende, sänk vid behov dosen.

**Förvaras i ytterförpackningen, ljuskänslig** (finns att låna på förlossningen om vi inte har det hemma på avdelningen)

<b>Doseringstabell Terbutalin (Bricanyl) 20 mikrogram / ml</b>		
Dos Mikrogram/kg/min:	0,05	0,1
<b>Kroppsvikt kg</b>	<b>Infusionshastighet ml / tim</b>	
0,5	*	0,15
1	0,15	0,3
1,5	0,23	0,45
2	0,3	0,6
2,5	0,38	0,75
3	0,45	0,9
3,5	0,53	1,05
4	0,6	1,2
4,5	0,68	1,35
5	0,75	1,5
5,5	0,83	1,65
6	0,9	1,8

\*Måste spädas ytterligare

## Arbetsgrupp

Irini Makrigianni Lindqvist, överläkare BB Skövde Neonatal, Fanny Svensson, sjuksköterska BB Skövde Neonatal.

## Käll- och litteraturförteckning

Acta Paed 90: 1213-1216. 2001J. Perinat. Med 20:437-441

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO1 Barn BUP och Kvinna

**Innehållsansvar:** Mikaela Bergström, (miks6),  
Barnsjuksköterska

**Godkänd av:** Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9699-1702881381-181

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-02-06

**Giltig till:** 2027-02-28