OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna
Innehållsansvar: Maher Abbas, (mahab5), Överläkare
Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-03
Giltig till: 2028-11-30

Akut behandling av allergisk reaktion, anafylaxi – barn- och ungdomsmedicin

Revideringar i denna version

Revidering: Texten under arbetsbeskrivning.

Bakgrund

Akut överkänslighetsreaktion kan framförallt uppträda vid förtäring av vissa födoämnen och vid inj av allergenextrakt (mediciner, bistick osv). Oftast uppträder urtikaria och eventuellt angioödem men chocktillstånd med livshotande blodtrycksfall kan utvecklas. Tidiga symtom som klåda, hetta, ”myrkrypningar” i exempelvis handflator, fotsulor och i hårbotten samt torrhetskänsla i munnen och tryck över bröstet bör särskilt uppmärksammas och föranleda snar behandling eftersom symtomen snabbt kan utvecklas till en allvarlig reaktion.

Arbetsbeskrivning

I oktober 2024 publicerades Nationellt vårdprogram för anafylaxi av Svenska föreningen för Allergologi (SFFA). Som ett komplement har Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin tagit fram detta dokument med sammanfattning och praktiska råd för handläggning av anafylaxi hos barn och ungdomar.

Dokumentet applicerats i september 2025 på BLF allergi. Se nedanstående länk till dokumentet:

Anafylaxi.260821-2.pdf

Egenvårdsplan för barn med anafylaxi hittas via denna länk:

handlingsplan.anafylaxi.final250911.2.pdf

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Maher Abbas, (mahab5), Överläkare

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9699-1702881381-19

Version: 8.0

Giltig från: 2026-11-03

Giltig till: 2028-11-30