

Herpes simplex munsår, neonatalvård - information till personal och föräldrar

Revidering i denna version

Ny rutin

Bakgrund och syfte

Att förhindra smitta av herpes simplex virus (HSV) till spädbarn på neonatalavdelningen och på så sätt minska förekomst av sjuklighet på grund av HSV infektion.

Arbetsbeskrivning

Handläggning för personal

ALLTID tänka på basala hygienrutiner

- Vid tecken på begynnande munsår (rodnad, sveda, klåda) starta antiviral behandling så fort som möjligt (med plåster/tabletter).
 - Munsårsplåster finns att köpa på apoteket.
 - Tablettbehandling kan inledas med läkemedel från läkemedelsrummet och ordineras för fortsatt användning av jourhavande läkare
- Begränsa patientkontakt om möjligt och undvik direkt vård av extremt prematura barn.
- Vid kontakt med patienter ska munskydd användas, och antiviral behandling enligt ovan ska vara påbörjad.
- Vid allmän påverkan skall personal sjukskriva sig enligt sedvanlig rutin.

Handläggning för föräldrar

- Informera anhöriga om riskerna med aktivt munsår och tydliggör att vätskande blåsa är smittsam tills den är helt torr.
- Betona vikten av basala hygienrutiner.
- Rekommendera antiviral behandling liknande den för personal.
- Kräv användning av munskydd samt undvik ansiktskontakt med spädbarnet.
- Övriga anhöriga med munsår tillåts inte besöka neonatalavdelningen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Anna Stål, (annka271), Sektionsledare

Granskad av: Josefine Hätting, (josos), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9699-1702881381-243

Version: 1.0

Giltig från: 2025-01-17

Giltig till: 2027-01-30