

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Michael Backhaus, (micba1), Överläkare

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-15

Giltig till: 2027-09-30

Blåspunktion - barn

Revideringar i denna version

Förlängt giltighetstiden.

Syfte

Arbetsbeskrivning för utförande av blåspunktion.

Arbetsbeskrivning

Indikation:

Urinodling hos barn <1 års ålder

Kontraindikationer:


- *tom blåsa
- *dehydrering
- *utspänd buk
- *förstorade inre organ
- *missbildningar i bukorganen
- *missbildningar i urogenitalorganen
- *blödningsbenägenhet

Inför proceduren:

- Emla minst 1 timme innan (om det ej är akut)
- föräldrarna ska vara väl informerade
- barnet ska vara nymatat eller fått extra vätska

Utförande

- Kontrollera att barnet inte kissat under förgående 30 min
- Barnet ligger på rygg på plant underlag
- Tvättning av huden mellan symfysen och naveln med klorhexidinsprit 5mg/ml
- Ge 30% glykoslösning per os (max 1ml) vid sticktillfället
- Använd 5ml spruta tillsammans med injektionskanyl och stick genom huden i medellinjen cirka 2cm ovanför symfysen som lokaliserats med ett finger
- Aspirera urin och dra ut kanylen.
- Tryck lätt över punktionsstället tills eventuell blödning avstannat och sätt på häftplåster
- Överför urinen till plaströr
- Ingen observation efteråt behövs.



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Michael Backhaus, (micba1), Överläkare

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9699-1702881381-34

Version: 7.0

Giltig från: 2025-09-15

Giltig till: 2027-09-30