

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Giltig från: 2025-09-18

Innehållsansvar: Veronica Norlin, (verno1), Barnsjuksköterska

Giltig till: 2027-09-30

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Bröstmjölksordination - neonatalvård

Revideringar i denna version

Förlängt giltighetstiden.

Bakgrund, syfte och mål

Vägledning vid bröstmjölksordination.

Arbetsbeskrivning

Vi har på BB Skövde Neonatalavdelning enbart pastöriserad donatormjolk.

Pastöriserad mjölk

Värmebehandlingen avdödar virus och bakterier. Samtidigt förstörs vissa av bröstmjölksens inneboende antibakteriella egenskaper (ökad risk för att kontamination efter pastöriseringen kan leda till snabb bakterietillväxt och smittrisk) samt vissa enzymer m m.

Ges till prematura (v b även fullgångna) barn där modern ej har tillräckliga bröstmjölksmängder. **Skall ordinerars av läkare.**

Opastöriserad mjölk – kan ges i yttersta nödfall.

Om mjölken skall ges opastöriserad måste varje donerad portion mjölk vara bakteriologiskt kontrollerad (d v s odlad) och donatorn skall vara CMV-negativ.

Kan ges till extremt prematura barn under första tiden (framförallt om de inte får någon mjölk från den egna mamman). **Skall ordinerars av läkare.**

Ordination av donerad bröstmjölk görs i nutritionsmallen, läkemedelsmodulen i Melior. Ange kod och proteinhalt.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Veronica Norlin, (verno1), Barnsjuksköterska

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9699-1702881381-39

Version: 7.0

Giltig från: 2025-09-18

Giltig till: 2027-09-30