

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Giltig från: 2025-12-29

Innehållsansvar: Torun Bergdahl, (torbe8), Överläkare

Giltig till: 2027-12-31

Granskad av: Josefine Hätting, (josos), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Hypoglykemi hos diabetiker - barn

Revideringar i denna version

Revidering markerat med gult.

Bakgrund, syfte och mål

Instruktion om åtgärder vid hypoglykemi hos diabetiker

Arbetsbeskrivning

Definition av hypoglykemi hos diabetiker

Plasmaglukos < 3,5 mmol/l med eller utan adrenerga eller neuroglykopena symtom.

Barn	0 – 7 år	2 st.
	>7 år	3 st.
Vuxen/storvuxen tonåring		4 (-6) st.

Alternativ:

1 bit druvsocker/10 kg kroppsvikt höjer p-glukos cirka 4 mmol/l.

Glucagon (1mg/ml)

Ges som injektion på lårets framsida-lateralsida vid grav hypoglykemi/coma/kramper där peroral tillförsel av sockerlösning ej är möjlig.

<5 år	0,25 mg/sc/im
5-10 år	0,5 sc/im
>10 år	1,0 mg/sc/im

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Torun Bergdahl, (torbe8), Överläkare

Granskad av: Josefine Hätting, (josos), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9699-1702881381-73

Version: 7.0

Giltig från: 2025-12-29

Giltig till: 2027-12-31