

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Giltig från: 2026-03-06

Innehållsansvar: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Giltig till: 2028-03-06

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

# Graviditet och amning, jodkontrast remittentinformation – BFM Radiologi

Förändringar sedan föregående version  
Förlänger giltighetsdatum.

## Syfte

Att klargöra riktlinjer vad gäller gravida och ammande som får jodkontrastmedel i samband med undersökning.

## Bakgrund

### Graviditet

- Jodkontrastmedel kan passera placentabarriären eller diffundera från moderns blod till fostervattnet.
- Fritt jodid i kontrastmedel passerar placentabarriären obehindrat.

### Mutagena och teratogena effekter av jodkontrastmedel

- Det föreligger inga hållpunkter för reproduktionstoxikologiska effekter av jodkontrastmedel på människa men erfarenheterna är begränsade.

### Effekter på fostrets tyreoida

- Jodkontrastmedel som engångsdos antas påverka fostrets tyreoida endast temporärt om moderns njurfunktion är normal.

## Amning

- Kontrastmedelsdosen till barnet vid amning är endast en bråkdel av vad nyfödda tolererar vid diagnostiska undersökningar.
- Toxiska reaktioner eller överkänslighetsreaktioner har inte rapporterats och risken torde närmast vara teoretisk.

## Rekommendationer

### Graviditet

- Undersökningar av gravida med jodkontrastmedel bör om möjligt skjutas upp post-partum.
- När modern undersökts med jodkontrastmedel behövs ingen ytterligare kontroll av tyreoidfunktionen hos det nyfödda barnet än den som ingår i den neonatala screeningen 2:a levnadsdagen med undantag för prematura och fullgångna nyfödda med annan allvarlig sjukdom som också bör kontrolleras efter ytterligare en vecka.

### Amning

- Amning kan fortsätta utan uppehåll efter undersökningar med jodkontrastmedel.
- Om modern trots allt känner tveksamhet kan hon göra 24- timmars amningsuppehåll efter undersökningen. I så fall lämpligt att använda bröstpump före undersökningen för att spara undan mjölk till dygnet efter.
- Det av verksamheten valt jodkontrastmedel kan användas vid all radiologisk undersökning och/eller behandling, ett specifikt jodkontrastmedel behöver inte användas om patienten ammar.

## Käll- och litteraturförteckning

[Rekommendationer och riktlinjer - Svensk Förening för Medicinsk Radiologi \(slf.se\)](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Skaraborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

**Granskad av:** Arthur Adelved, (artad1), Enhetschef, Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Godkänd av:** Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-124

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2026-03-06

**Giltig till:** 2028-03-06