

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-03-25

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2028-04-17

Granskad av: Joakim Palmquist, (joapa1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Kolangiografi, postoperativ – konventionell röntgen

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum.

Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av Kolangiografi postoperativt.

För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Metodmall

Us kod/Us namn

454000 Kolangiografi, postoperativ.

Förberedelser

Inga.

Material

Två 20 ml sprutor.

Adapter som passar till katetern.

Kontrastmedel

Omnipaque 140 mgI/ml, mängd: 40 ml vid konkrementdiagnostik.

Omnipaque 240 mgI/ml, mängd: 40 ml vid frågeställning läckage och kolangit.

Kontraindikation

Kontrollera allergi, diabetes.

Patientinformation/förberedelser på lab

Informera patienten om undersökningen.

Bildtagning/Projektioner

Obs! Aspirera luften från katetern innan kontrastinjektionen.

Förbild som skall innefatta hela gallvägssystemet och kateter.

Övriga bilder tas under insprutning av kontrast och i genomlysning inklusive vridningar.

Friprojektion av samlingsystemet och rak sida eftersträvas.

Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

Relaterad information

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Lokala anvisningar.

Arbetsgrupp

Medicinska processen för konventionell radiologi.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Joakim Palmquist, (joapa1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-154

Version: 11.0

Giltig från: 2026-03-25

Giltig till: 2028-04-17