

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-02-16

Innehållsansvar: Annica Berg, (annbe22), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-02-09

Granskad av: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Kolon, datortomografi (DT) - förberedelse

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Revidering av textinnehåll. Byte av andrahandsval laxermedel.

Syfte

Instruktion riktad till personal verksam inom Bild och Funktionsmedicin för förberedelse DT-kolon.

Utförande

DT-KOLON förberedelseschema

Laxabon förstahandsval vid förberedelser inför DT-Kolon.

LAXABON:

LAXABON® (två påsar) är ett laxermedel i pulverform.

Varje påse ska lösas upp i 1 liter vatten (totalt 2 liter).

Varje liter administreras peroralt, 1 glas (1.25 dl) var 15 minut enligt schema nedan.

E-Z CAT 720 ® (tre flaskor) är en vätska innehållande bariumkontrast som ska blandas med vatten. Det märker (färgar) eventuellt kvarvarande innehåll i tjocktarmen, så att innehållet kan urskiljas från äkta slemhinneförändringar.

Blanda en flaska med 2,75 dl vatten. Total mängd blir 5 dl vätska.

Rör om ordentligt.

Administreras peroralt, 2 dl/ gång enligt schema nedan

OMNIPAQUE® (350 mg/ml, 100 ml) Flaskan innehåller ett jodkontrastmedel.

Ska spädas med 0,9 liter vatten. (Totalt 1 liter).

Administreras peroralt, 2 dl/gång enligt schema nedan.

Toilax®, 2 tabletter (5 mg) samt ett klysmat (10 mg/5 ml) för att tömma tarmen på vätska innan undersökningen.

Tabletterna administreras peroralt. Klysmat rektalt.

Laxabon					
	EZ-CAT 720 (2 dl x 5)	Jodkontrast OMNIPAQUE ® (2 dl x 5)	Laxabon (1 liter x 2)	Tablett Toilax (0 mg)	Klysmat Toilax (1 st)
2 dagar innan undersökning					
12:00	X				
18:00	X				
1 dag innan undersökning					
8:00	X	X			
12:00	X	X			
14:00 – 16:00			X		
15:00		X			
18:00		X			
18:00 – 20:00			X		
22:00	X	X		X	
Undersökningsdagen					
1 – 2 timmar innan us.					X

Om patient inte kan förberedas med Laxabon kan Picoprep ges som förberedelse inför DT-kolon på särskild ordination av radiolog.

Radiolog noterar i remissanteckning.

Sekreterare som skall boka undersökningen stämmer av med läkemedelsansvarig sköterska som ombesörjer beställning av laxermedlet. OBS! Patienten skall bokas in på en tid klockan 13:00 – 14:00 tiden för optimal förberedelse.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Annica Berg, (annbe22),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-157

Version: 17.0

Giltig från: 2026-02-16

Giltig till: 2028-02-09