

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-09-19

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2027-09-25

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Kolon, enkelkontrast vid perforation – konventionell röntgen

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Tagit bort rubriken Programval

Flourospot T.O.P.

Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av colon med frågeställning perforation, distala colon. Observera att det i de flesta fall kan vara lämpligare med DT undersökning. För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Utförande/metodblad

Undersökning: Kolon enkelkontrast – med frågeställning perforation distala colon.

Patientförberedelser: Inga

Materiel: Kolonpåse, rectalpip med ballong, kateterklämma, peang.

Kontrastmedel: 200 ml Omnipaque 240 mgI/ml, blandas med 150 ml vatten.

Patientinformation/förberedelser på lab: Informera patienten om undersökningen.
Sätt in rectalpipen

Projektion: Bildtagning av läkare under kontrastingjutning och genomlysning.

Dokumentation i Sedvanligt ifyllande i undersökningskortet.
RIS:

Relaterad information

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar

Lokala anvisningar

Arbetsgrupp

Medicinska processen för konventionell radiologi.

Käll- och litteraturförteckning

Se i riktlinje konventionella undersökningar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-158

Version: 10.0

Giltig från: 2025-09-19

Giltig till: 2027-09-25