

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-04-09

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2028-05-21

Granskad av: Katarina Andersson, (katan15), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Tunntarmspassage, förberedelse, röntgenundersökning - barn

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum.

Syfte

Informationsblad till vårdavdelning inför tunntarmspassageundersökning.

Metodmall

Remiss

Röntgenremiss.

Indikation

Subileus/Ileus.

Malrotation.

Inflammatorisk tarmsjukdom.

Passagetid.

Förberedelse

Informera barnet och föräldrarna om undersökningen.

Akut undersökning	Inga förberedelser.
Barn under 2 år	Får inte äta eller dricka 4 timmar före undersökningstiden.
Barn över 2 år	Får inte äta och dricka efter klockan 00.00.

	Barn som har knappsond eller liknande, får inte äta eller dricka 4 timmar före undersökningstiden.
Diabetiker	Frågor angående svälttiden med tanke på intag av insulin, kontakta patientansvarig läkare.

Tillvägagångssätt

Tunntarmens funktion och utseende undersöks. Undersökningen påbörjas som regel i genomsynning och barnet får dricka ett kontrastmedel som passerar från magsäcken över till tunntarmen. Barnet lägger sig på höger sida eller är uppegående/sittande tills magsäcken är tömd. Kontrastmedlet följs genom tunntarmen tills det börjar passera över till tjocktarmen. Bildtagning sker med olika tidsintervaller under undersökningen beroende på den hastighet med vilken kontrastmedlet passerar genom tunntarmarna.

Undersökningstid

2–6 timmar beroende på hur snabbt kontrastmedlet passerar genom tarmen. Viktigt att föräldrar/medföljande blir informerade om att undersökningen kan dra ut på tiden.

Eftervård

Ingen speciell eftervård krävs.

Övirga upplysningar

Kontrastvätskan kan smaksättas med koncentrerad saft eller chokladpulver.

Om barnet kommer polikliniskt, informera föräldrarna att de kan ta med något lätt att äta då barnet som regel får äta lite efter att kontrastvätskan har försvunnit från magsäcken.

Vid undersökning av mindre barn är det nödvändigt att en vuxen är med under bildtagningen. Ett välbekant ansikte innebär trygghet för barnet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Katarina Andersson, (katan15), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-16

Version: 5.0

Giltig från: 2026-04-09

Giltig till: 2028-05-21