

Gäller för: VO4 Akutsjukvård, VE Bild o funktionsmed
Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Bengt Orrenius, (benor), Processchef
Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-28

Giltig till: 2027-10-28

Peroralt kontrastmedel inför datortomografi – inneliggande patient

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Revidering av textinnehåll.

SkaS-övergripande dokument. Publiceras för verksamhetsområde VO2 och VO4.

Syfte

Administration av peroralt kontrastmedel före datortomografi av buken för inneliggande patienter på SkaS Skövde.

Utförande

Vid samtal från röntgen ges ordination inför en datortomografi buk. Patientens namn, personnummer och tid när patienten ska börja dricka ska ges.

Dosering: Blanda 20 ml Omnipaque 300 mgI/ml med 1000 ml vatten. Blandningen ska drickas jämnt fördelat under två timmar innan undersökningen skall påbörjas.

Alternativ ordination: 1 000 ml vatten, dricks jämnt fördelat under två timmar innan undersökningen ska påbörjas.

Alternativ ordination: (Vid undersökning endast övre bukorgan) Blanda 10 ml Omnipaque 300 mgI/ml blandas med 500 ml vatten. Detta dricks jämnt fördelat under 1/2 timma.

Ingen fast föda två timmar före undersökning.

Vid avvikelse från ordination var god ring CT-lab telefon: 313 55.
Till exempel om patienten inte startat att dricka vid bestämd tid,
om inte all kontrast druckits upp eller om patienten kräcks upp
stor del av kontrasten.

Relaterad information

Lokala rutiner.

Arbetsgrupp

Medicinska processen för datortomografi

Processchef för VO9.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO4 Akutsjukvård, VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Bengt Orrenius, (benor), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-250

Version: 17.0

Giltig från: 2025-10-28

Giltig till: 2027-10-28