

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2024-11-19

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2026-11-19

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Tunntarmspassage – konventionell röntgen

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat texten under Patientförberedelser, Projektion samt under bildkriterium.

Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av tunntarmspassage beroende på frågeställning/anamnes.

För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje Konventionella undersökningar.

Utförande

Us kod/Us namn

Tunntarmspassage.

Förberedelser

Oftast i anslutning till aktuell buköversikt/DT-Buk. Remissen ska alltid prioriteras av radiolog.

Särskilda rutiner gäller nattetid klockan 22.00-07.00 då ska remissen skickas för prioritering via teleradiologi. Ge patienten kontrast direkt och ta första bilden klockan 07.30. Det kan alltså gå mer än 2 timmar till bildtagning men minst 2 timmar efter kontrastintag. OBS! Viktigt att dokumentera datum och tid då passagen startade. Skriv rätt antal timmar i bilden.

Efter kontrastintag ska patienten ligga på höger sida så mycket som möjligt för att tömma ventrikeln.

Kontrastmedel

Peroral kontrast (1,5 dl Liquid Polibar Plus + 1,5 dl vatten).

Ge patienten 3 dl av den färdigblandade kontrasten.

Projektioner

Patienten i ryggläge. Bild tas från diafragman ner till och med symfysen.

Stitchning kan med fördel användas annars tas bild på övre- och nedre buk.



Oftast tas första bilden 2 timmar efter det att kontrasten druckits upp.

Notera i remissen antal timmar och klockslag. Använd färdigt formulär i undersökningsfönstret – under journal – vgr passage (signera inte med lösenord utan endast spara).

Fyll i kontrasten i fliken Läkemedel i undersökningsfönstret i PACS.

Antal timmar skall skrivas på bilden (i modalitet där det är möjligt).

Patient i höger sidoläge så mycket som möjligt för att tömma ventrikeln.

Bildkriterium

Tillförd kontrast skall vara med på bilden. Diafragma och symfysen ska vara med på bild.

Relaterad information

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Lokala anvisningar.

Arbetsgrupp

Medicinska processen för konventionell radiologi.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-355

Version: 10.0

Giltig från: 2024-11-19

Giltig till: 2026-11-19