

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-10-27

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2027-12-13

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Underarm – konventionell röntgen

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum.

Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av underarm.

För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje

Konventionella röntgenundersökningar.

Utförande/metodblad

Observera om patienten enbart har status i handled eller armbåge ska respektive område undersökas och inte underarm.

Bildtagning **A. Standard** är bild 1(frontal) och bild 2 (sida).
B. Myelom. Var god se myelomskelett!

Projektioner Undersökningen ska göras om det intressanta området ligger inom underarmens proximala 3/4-delar. Ligger det intressanta området distalt tas handledsbilder. Detta är speciellt viktigt på frakturfrågeställning, där det är lätt att missa en distal radiusfraktur på underarmsbilder.

1. Frontal: Handens och underarmens dorsalsida mot bildplattan/ detektorn. Vid fraktur eller frakturkontroll i gips kan det vara svårt att positionera, men försök att få så rak frontal som möjligt.

Cstr: Mitt på underarmen.

Kriterier: Armbågen skall vara med på bilden och vara frontalprojicerad. Om möjligt skall även handleden synas på bilden.



2. Sidobild: Armbågen ska vara böjd upp mot 90 grader och axel, armbåge samt hand parallellt mot detektorn och lillfingersidan mot detta. Tummen ska peka mot röntgenröret.

Cstr: Underarmens mitt.

Kriterier: Rak sidoprojektion av armbågen och helst också handleden.



Barn Jämförande frontal.

Bildpresentation Frontal och därefter sida.

Bedömnings-tips

1. Vid en isolerad ulnadiaphysfraktur bör man även ta en frontal och sidobild av armbågsleden för att se efter luxation av caput radii (Monteggiafraktur).
2. Vid en isolerad radiusdiaphysfraktur bör man även ta en frontal och sidobild av handleden för att se efter luxation i caput ulnae (Galeazzifratkur).

Relaterad information

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Lokala anvisningar.

Arbetsgrupp

Medicinska processen för konventionell radiologi.

Käll- och litteraturförteckning

Se i riktlinje konventionella undersökningar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-359

Version: 12.0

Giltig från: 2025-10-27

Giltig till: 2027-12-13