

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-03-06

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-28

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Kateter utanför tarmkanal - intervention

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat rubrik och textinnehåll. Ny innehållsgranskare Filip B.

Syfte

Instruktion riktad till personal verksam inom intervention, Bild och Funktionsmedicin Skövde. Undersökning/procedur för justering och kontroll av kateter belägen utanför tarmkanalen ex PD (Peritoneal Dialys) kateter.

Förutsättningar

Ansvar

Remittenten ansvarar för att remissen innehåller sådan information så att lämplig metod att utföra undersökning och/eller behandlande procedur på kan avgöras.

Undersökande och/eller behandlande läkare skall utföra undersökning eller procedur enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvar enligt särskild rutin arbetsbeskrivning: [hybridsal, arbetsbeskrivning för interventionssjuksköterska, undersköterska.](#)

Avgränsningar

Dokumentet gäller för personal med placering inom Intervention, Bild och funktionsmedicin radiologi SkaS vid prioritering, berättigande-bedömning, uppdukning, utförande och bedömning.

Utrustning

Mediel Celex

Siemens Artis Pheno

Annan kringutrustning som är nödvändig för ingreppet.

Utförande

Buk, kontroll efter intervention eller annat ingrepp 460 608.

Buk, justering av kateter eller sond 460 605.

Undersökningsrum: SKASS GML2/ GML1

m: SKASS OPHYB7

Patientförberedelse på avdelningen: Transport i säng.

Material:
Buk, justering av kateter eller sond.
Uppdukningsset: PNP/PTD Skövde.
Ledare enligt önskemål från interventionist.

Buk, kontroll efter intervention eller annat ingrepp.
1 st bordsduk.
1 st 10 ml LL spruta.
1 st 20 ml LL spruta.
Uppdragningsnål till kontrast.
Etiketter (osterila).

Dokumentation i Melior: Öppna upp mallen ”Rtg intervention”, fyll i och signera.

Patientförberedelser på lab: Placera patienten rygggläge.
Armstöd med trycksårsprofylaxkuddar sätts på plats.
Tvätta befintlig kateter med Descutansvamp 4% därefter med Klorhexidinsprit 5 mg/ml.

Tvätt: Descutansvamp 4% och Klorhexidinsprit 5 mg/ml.

Läkemedel: NaCl 40 ml.

Kontrastmedel: Visipaque 270 mgI/ml (50 ml).

Dokumentation/ Programval: PTC

Dokumentation i PACS: Enstaka bild.
Dokumentera kontrastmedel och mängd.
Buk, kontroll efter intervention eller annat ingrepp

460 608.

Buk, justering av kateter eller sond 460 605.

Tips:

Gör en kontrastinjektion innan man börjar flytta på katetern, för att veta om katetern ligger intraperitonealt.

Relaterad information

Lokala anvisningar.

Rutiner IVC.

Rutin arbetsbeskrivning hybridsal.

Arbetsgrupp

IVC processen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-391

Version: 10.0

Giltig från: 2026-03-06

Giltig till: 2028-03-28