

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-02-25

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-28

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Perkutan nefropyelostomi (PNP) - byte

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll. Ny innehållsgranskare Filip B

Syfte

Instruktion riktad till personal verksam inom Intervention, Skövde. Undersökning/procedur för byte av PNP (Perkutan Nefrostomi) kateter.

Förutsättningar

Ansvar

Remittenten ansvarar för att remissen innehåller sådan information så att lämplig metod att utföra undersökning och/eller behandlande procedur på kan avgöras.

Undersökande och/eller behandlande läkare ska utföra undersökning eller procedur enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvar enligt särskild rutin arbetsbeskrivning [hybridsal, arbetsbeskrivning för interventionssjuksköterska, undersköterska](#)

Avgränsningar

Dokumentet gäller för personal med placering inom Intervention Bild och Funktionsmedicin Radiologi SkaS vid prioritering, berättigandebedömning, uppdukning, utförande och bedömning.

Utrustning

Mediel Celex

Siemens Artis Pheno

Annan kringutrustning som är nödvändig för ingreppet.

Utförande

Perkutan nefrostomi byte av kateter.

Undersökningsrum:	SKASS GML2/ GML1 SKASS OPHYB7
Patientförberedelse:	Undersökning kan göras polikliniskt men ibland görs detta ineliggande på grund av antibiotikaproylax. Byt om till patientskjorta i omklädningshytten om ingreppet görs polikliniskt.
Material:	Uppdukningsset: PNP/PTD Skövde. Ledare Amplatz super stiff 75 cm. PNP- kateter (se efter vilken grovlek på katetern patienten har). Fixeringsförband. Mellanstycke + urinpåse med kort slang.
Dokumentation i Melior:	Öppna upp mallen "Rtg: intervention" i Melior fyll i protokollet och signera.
Patientinförbered-elser på lab:	Ta bort gamla klisterrester med sterilium. Tvätta PNP-katetern och runt denna noga med Descutan svamp 4%, därefter med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Hör med undersökande interventionist om lämplig position till exempel i snett bukläge. Armstöd med trycksårsproylaxkuddar sätts på plats.
Tvätt:	Descutan svamp 4% + Klorhexidinsprit 5 mg/ml.
Läkemedel:	NaCL 500 ml.
Kontrastmedel:	Visipaque 270 mgI/ml (20 ml).
Kateterfixering:	Fixera katetern framåt magen och sedan nedåt låret.
Dokumentation/ Programval:	Sidomarkering (dx eller sin). PNP BYTE

Dokumentation i

PACS:

Enstaka bilder, skicka valda bilder till PACS.
Dokumentera kontrastmedel och mängd.
Perkutan nefrostomi, byte av kateter 590 611.

Tips:

Använd cavilon som skydd mot känslig röd hud.

Relaterad information

Lokala anvisningar.

Rutiner IVC.

Rutin arbetsbeskrivning hybridsal.

Arbetsgrupp

IVC processen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-394

Version: 9.0

Giltig från: 2026-02-25

Giltig till: 2028-03-28