

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-02-25

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-28

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Perkutan nefropyelostomi (PNP) - dragning

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll. Ny innehållsgranskare Filip B

Syfte

Instruktion riktad till personal verksam inom Intervention, Bild och funktionsmedicin, Skövde. Undersökning/procedur för borttagande/dragning av PNP (perkutan nefrostomi) kateter.

Förutsättningar

Ansvar

Remittenten ansvarar för att remissen innehåller sådan information så att lämplig metod att utföra undersökning och/eller behandlande procedur på kan avgöras.

Undersökande och/eller behandlande läkare skall utföra undersökning eller procedur enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvar enligt särskild rutin arbetsbeskrivning: [hybridsal](#), [arbetsbeskrivning för interventionssjuksköterska, undersköterska](#).

Avgränsningar

Dokumentet gäller för personal med placering inom Intervention Bild och funktionsmedicin Radiologi SkaS vid prioritering, berättigandebedömning, uppdukning, utförande och bedömning.

Utrustning

Mediel Celex

Siemens Artis Pheno

Annan kringutrustning som är nödvändig för ingreppet.

Utförande

Undersökningsrum:	SKASS GML2/ GML1 SKASS OPHYB7
Patientförberedelse:	Byt om till patientskjorta om patienten kommer polikliniskt.
Material:	Uppdukningsset: PNP/PTD Skövde. Ledare enligt önskemål från interventionist till exempel Amplatz. Förband.
Dokumentation i Melior:	Öppna upp mallen ”Rtg: intervention”, fyll i protokollet och signera.
Patientförberedelser på lab:	Placera patienten i snett bukläge. Armstöd med trycksårsprofylaxkuddar sätts på plats. Ta bort gamla klisterrester med sterilium. Tvätt runt och på PNP- katetern med Descutan svamp 4 %, därefter med Klorhexidinsprit 5 mg/ml.
Tvätt:	Descutan svamp 4% + Klorhexidinsprit 5 mg/ml.
Kontrastmedel:	Visipaque 270 mgI/ml (20 ml).
Dokumentation/ Programval:	Sidomarkering (dx eller sin) PNP BYTE
Projektion:	Frontal.
Dokumentation i PACS:	Eventuellt enstaka bilder. Dokumentera kontrastmedel och mängd. Perkutan nefrostomi, borttagning av kateter 590 614.

Relaterad information

Lokala anvisningar.

Rutiner IVC.

Rutin arbetsbeskrivning hybridsal.

Arbetsgrupp

IVC processen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-395

Version: 9.0

Giltig från: 2026-02-25

Giltig till: 2028-03-28