

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-03-03

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-28

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Perkutan nefropyelostomi (PNP) - kontroll

## Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll. Ny innehållsgranskare Filip B

## Syfte

Instruktion riktad till personal verksam inom Intervention, Skövde. Undersökning/procedur för kontroll av PNP (Perkutan Nefrostomi) kateter.

## Förutsättningar

### Ansvar

Remittenten ansvarar för att remissen innehåller sådan information så att lämplig metod att utföra undersökning och/eller behandlande procedur på kan avgöras.

Undersökande och/eller behandlande läkare skall utföra undersökning eller procedur enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvar enligt särskild rutin arbetsbeskrivning: [hybridsal, interventionscentrum – arbetsbeskrivning för sjuksköterska, undersköterska.](#)

### Avgränsningar

Dokumentet gäller för personal med placering inom Intervention, Bild och funktionsmedicin Radiologi SkaS vid prioritering, berättigandebedömning, uppdukning, utförande och bedömning.

## Utrustning

Mediel Celex

Siemens Artis Pheno

Annat kringutrustning som är nödvändig för ingreppet.

## Arbetsbeskrivning

### Undersökningsrum:

SKASS GML2/ GML1

SKASS OPHYB7

### Patientförberedelse:

Byt om till patientskjorta om patienten kommer polikliniskt.

### Material:

OBS! Inga privata kläder.

Bordsduk (liten).

2 st 10 ml spruta.

Uppdragningskanyl.

Etiketter.

Mellanstycke och urinpåse med kort slang.

### Dokumentation i

#### Melior:

Öppna upp mallen "Rtg: intervention", fyll i protokollet och signera.

### Patientförberedelser på lab:

Lägg patient så att man kommer åt befintlig kateter, ofta i ryggläge.

Om misstanke finns om eventuellt byte, justering av katetern hör med undersökande interventionist om lämplig position till exempel i snett bukläge.

### Kontrastmedel:

Visipaque 270 mgI/ml (20 ml).

### Dokumentation/ Programval:

Sidomarkering (dx och sin)

PNP BYTE

### Projektion:

Frontal och sida.

### Dokumentation i PACS:

Enstaka bilder, skicka valda bilder till PACS. Dokumentera kontrastmedel och mängd. Perkutan nefrostomi, kontroll efter intervention eller annat ingrepp 590 608.

## Relaterad information

Lokala anvisningar.

Rutiner IVC.

Rutin arbetsbeskrivning hybridsal.

## Arbetsgrupp

IVC processen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

**Granskad av:** Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-398

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2026-03-03

**Giltig till:** 2028-03-28