

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-03-09

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-13

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Perkutant transhepatiskt dränage (PTD) - byte

## Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll. Ny innehållsgranskare.

## Syfte

Instruktion riktad till personal verksam inom Intervention Bild och funktionsmedicin, Skövde för undersökning/procedur av byte av PTD (Perkutan Transhepatisk Dränage).

## Förutsättningar

### Ansvar

Remittenten ansvarar för att remissen innehåller sådan information så att lämplig metod att utföra undersökning och/eller behandlande procedur på kan avgöras.

Undersökande och/eller behandlande läkare skall utföra undersökning eller procedur enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvar enligt särskild rutin arbetsbeskrivning: [hybridsal, – arbetsbeskrivning för interventionssjuksköterska, undersköterska](#)

### Avgränsningar

Dokumentet gäller för personal med placering inom Intervention, Bild och Funktionsmedicin Radiologi SkaS vid prioritering, berättigandebedömning, uppdukning, utförande och bedömning.

## Utrustning

Siemens Artis Pheno

Annan kringutrustning som är nödvändig för ingreppet.

## Utförande

**PTC med externt dränage, byte av kateter eller sond.**

**PTC med internt dränage, byte av kateter eller sond.**

**Undersökningsrum:** SKASS OPHYB7/OPHYB8

**Patientförberedelse  
på avdelning:** Ingreppet görs i narkos.  
Operationsanmälan skrivs av  
remitterande klinik i Orbit.

Transport i säng.

**Material:** Uppdukningsset: PNP/PTD  
Skövde.  
Ledare enligt önskemål från  
interventionist till exempel  
Amplatz.  
Galldränage kateter (8 Fr) alt  
PNP-kateter (8 Fr).  
Fixeringsförband.  
Mellanstycke och urinpåse med  
kort slang.

**Dokumentation i  
Melior:** Öppna upp mallen "Rtg  
intervention" i Melior fyll i  
protokollet och signera.

**Patientförberedelser  
på lab:** Steril tvätt övre buk. Ta bort  
gamla klisterrester med  
Sterilium. Tvätt runt och på  
PTD-katetern med Descutan  
svamp 4%, därefter med  
Klorhexidinsprit 5 mg/ml.  
Armstöd med  
trycksårsprofylaxkuddar sätts på  
plats.

**Positionering av  
Pheno:** Bordet vinklat till 0 grader.  
Patienten liggande Head first –  
Supine. Röntgenröret ska vara  
inställt på Left side.  
Styrkonsol på höger sida om

	patienten. Läkaren och assisterande sjuksköterska på patientens högra sida. Narkosapparat på patientens högra sida, vid huvudändan.
<b>Tvätt:</b>	Descutan svamp 4 % + Klorhexidinsprit 5 mg/ml.
<b>Läkemedel:</b>	NaCL 500 ml.
<b>Kontrastmedel:</b>	Visipaque 270 mgI/l (50 ml).
<b>Dokumentation/ Programval:</b>	PTD
<b>Dokumentation i PACS:</b>	Enstaka bilder. Dokumentation av patientens längd och vikt samt kontrastmedel och mängd. PTC med externt dränage, byte av kateter eller sond 490 611. PTC med internt dränage, byte av kateter eller sond 491 611.

## Relaterad information

Lokala anvisningar.

Rutiner IVC.

Rutin arbetsbeskrivning hybridsal.

## Arbetsgrupp

IVC processen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

**Granskad av:** Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-400

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2026-03-09

**Giltig till:** 2028-03-13